



210026NL Sample_Report

Sample_Report, 210026NL

Geb. 01.01.2000 w

Barcode 43287735

Laboratoriumnummer 2508082756

Monsterafname op 08.08.2025

Ontvangst op 08.08.2025 14:24

Uitslag op 08.08.2025

laboratorium rapport

Uitslag, Pagina 1 van 13

Benodigd onderzoeksmateriaal: ontlasting, Microbioom speciaal buisje

Diversiteit




De diversiteit komt overeen met de verscheidenheid van de bacteriële flora in de darm. Het vertegenwoordigt de stabiliteit en kolonisatieresistentie.

FODMAP-Index




FODMAP-arme voeding wordt aanbevolen voor de verbetering van prikkelbare darm-achtige of gastro-intestinale klachten.

Frequentieverdeling bacteriënstammen



De frequentieverdeling vormt een overzicht van de verhoudingen onder de meest voorkomende bacteriënstammen en vergelijkt uw monster met de gemiddelde verdeling binnen de populatie.

Dysbiose




De dysbiose-pijlgrafiek verduidelijkt de afwijkingen van de pH-waarde, het rottingsflora, het verzurende en histaminevormende flora evenals de gisten en schimmels van de onderliggende referentiebereiken.

Algemene beoordeling dysbiose




Functionele bacteriegroepen




De pijlgrafiek toont de gemeten afwijkingen van de functionele bacteriegroepen van de populatiewaarden.

Bacteriële metabole activiteit




Een toewijzing tot de groepen gebeurde op basis van de bij de bacteriesoorten bekende overheersende metabole prestatie (gemodificeerd volgens Brown et al. 2011).

Enterotype onduidelijk



Het darm-microbioom kan vanwege de dominerende bacteriën in 3 enterotypes verdeeld worden, die conclusies mogelijk maken over langetermijn-eetgewoonten.

Microbioom-geassocieerde risico's



Het microbiom heeft invloed op bepaalde gezondheidsrisico's. Het optreden van deze risico's kan worden veroorzaakt door het ontbreken van beschermende bacteriën of door de aanwezigheid van potentieel pathogene bacteriën. Pijlen in de grafiek duiden op een verhoogd microbiom-geassocieerd risico in dit gebied.

laboratorium rapport

Uitslag, Pagina 3 van 13



Bio-indicatoren

pH-waarde van de ontlasting	6,8		5,5 - 6,5
Biodiversiteit (Shannon index)**	5,48		> 4,6
Firmicutes / bacteroidetes-verhouding**	5,3		2,9 - 4,8
Butyraat vorming**	23,4 %		11,0 - 19
Lactaat vorming**	3,2 %		1,5 - 7,7
Acetaat- / propionaatvorming**	13,7 %		12,0 - 21
Mucinedegradatie**	2,6 %		0,01 - 7,4
LPS-dragende bacteriën**	2,450 %		< 2,2


Bacteriestammen (phyla)

Firmicutes	70,965 %		61 - 70
Bacteroidetes	13,280 %		14 - 22
Proteobacteria	3,910 %		1,4 - 5,9
Actinobacteria	6,573 %		3,6 - 11
Verrucomicrobia	2,608 %		0,001 - 3,2
Fusobacteria	0,003 %		< 0,002
Cyanobacteria	0,013 %		0,001 - 0,009
Euryarchaeota	0,000 %		< 0,05
Tenericutes	0,365 %		0,001 - 0,1

Functionele bacteriegroepen




Mucinedegraderende bacteriën

Akkermansia muciniphila	2,657 %		0,001 - 3,2
Prevotella spp.	0,000 %		0,001 - 2,4
Prevotella copri	0,000 %		< 0,7



Mucosaprotectieve microbiota

Akkermansia muciniphila	2,657 %		0,001 - 3,2
Faecalibacterium prausnitzii	13,031 %		6,7 - 12



Sulfaatreducerende bacteriën

Bilophila wadsworthia	0,015 %		< 0,4
-----------------------	---------	--	-------

Desulfobacter spp.	0,000	% 	< 0,001
Desulfovibrio spp.	0,000	% 	< 0,2
Desulfuromonas spp.	0,000	% 	< 0,001

Neuroactieve microbiota

Bifidobacterium adolescentis	0,892	% 	0,001 - 2,6
Bifidobacterium dentium	0,001	% 	> 0,001
Lactobacillus brevis	0,000	% 	> 0,001
Lactobacillus plantarum	0,003	% 	> 0,001
Lactobacillus paracasei	0,000	% 	> 0,001
Oscillibacter spp.	0,098	% 	< 0,3
Alistipes spp.	1,354	% 	0,2 - 1,3

Methaanvormende bacteriën

Methanobacteria	0,000	% 	< 0,05
Methanobrevibacter spp.	0,000	% 	< 0,04

LPS-dragende bacteriën

Citrobacter spp.	0,792	% 	< 0,002
Enterobacter spp.	0,021	% 	< 0,006
Escherichia spp.	0,970	% 	< 0,1
Klebsiella spp.	0,040	% 	< 0,003
Providencia spp.	0,000	% 	< 0,001
Pseudomonas spp.	0,001	% 	< 0,001
Serratia spp.	0,001	% 	< 0,001
Sutterella spp.	0,357	% 	< 1,6

Immuunmodulatie

Escherichia spp.	0,970	% 	< 0,1
Enterococcus spp.	0,288	% 	0,001 - 0,01

Vezelaafbrekende microbiota

Bifidobacterium adolescentis	0,892	% 	0,001 - 2,6
Ruminococcus spp.	7,262	% 	0,7 - 5,1

Butyraatvormende bacteriën

Butyrivibrio crossotus	0,000	% 	> 0,001
Eubacterium spp.	0,949	% 	0,2 - 0,9
Faecalibacterium prausnitzii	13,031	% 	6,7 - 12
Roseburia spp.	2,118	% 	0,4 - 2,4
Ruminococcus spp.	7,262	% 	0,7 - 5,1

Acetaat-/ Propionaatvormende bacteriën

Alistipes spp.	1,354	% 	0,2 - 1,3
Bacteroides spp.	7,669	% 	6,4 - 15

laboratorium rapport

Uitslag, Pagina 5 van 13



Bacteroides vulgatus	0,008	%		0,6 - 5,1
Dorea spp.	1,118	%		0,5 - 1,2



Lactaatvormende / saccharolytische bacteriën

Bifidobacterium spp.	1,936	%		0,4 - 6,5
Bifidobacterium adolescentis	0,892	%		0,001 - 2,6
Enterococcus spp.	0,288	%		0,001 - 0,01
Lactobacillus spp.	0,509	%		0,07 - 1,3

Histaminevormende bacteriën

Clostridium spp.	62,000	%		0,4 - 0,9
Enterobacter spp.	0,021	%		< 0,006
Hafnia alvei	0,000	%		< 0,001
Klebsiella spp.	0,040	%		< 0,003
Serratia spp.	0,001	%		< 0,001
Escherichia spp.	0,970	%		< 0,1

Clostridiaceae

Clostridium spp.	62,000	%		0,4 - 0,9
Clostridium difficile	0,000	%		< 0,025
Clostridium scindens	0,133	%		> 0,006

Overige bacteriën



Fusobacterium nucleatum	0,000	%		< 0,001
Oxalobacter formigenes	0,083	%		> 0,001
Anaerotruncus colihominis	0,004	%		0,005 - 0,03
Streptococcus spp.	0,441	%		0,2 - 1,9

Gisten en schimmels

Candida spp.	0,003	%		< 0,002
Candida albicans	0,000	%		< 0,001
Geotrichum candidum	0,000	%		< 0,001
Saccharomyces cerevisiae	0,007	%		< 0,03
Schimmels**	negativ			negativ

Maag-darm-diagnostiek

Spijsverteringsresiduen:

Vet in de ontlasting**	2,2	g/100g		< 5,2
				Let op de gewijzigde referentiewaarden.
Watergehalte van de ontlasting**	70	g/100g		68,5-82,3
				Let op de gewijzigde referentiewaarden.
Eiwitten in de ontlasting**	1,4	g/100g		< 1,5
				Let op de gewijzigde referentiewaarden.
Zetmeel in de ontlasting**	8,9	g/100g		2,6 - 10,6
Suikergehalte in de ontlasting**	1,5	g/100g		< 2,3
				Let op de gewijzigde referentiewaarden.

Malabsorptie / Ontsteking / Leaky Gut:

Alpha-1-Antitripsine in de ontlasting	8,8	mg/dl		< 27,5
Zonuline (ontlasting)	1229,5	μU/g		< 60,1
Calprotectine in de ontlasting	<19.5	μg/g		< 50

Maldigestion:

Pancreaselastase in de ontlasting	224,0	μg/g		> 200
Galzuren in de ontlasting	3,85	μmol/g		0,46 - 9,96
				Let op de gewijzigde referentiewaarden.

slijmvliesimmunititeit:

Secretair IgA in de ontlasting	2524,0	μg/ml		510 - 2040
beta-Defensine 2	7,4	ng/ml		8,0 - 60,0

voedselallergie:

Eosinofiel proteïne X i. ontlasting	550,0	ng/ml		< 440
-------------------------------------	-------	-------	--	-------

Protozoën (Parasieten) i. ontlasting (multiplex PCR):

Blastocystis hominis (PCR)	negativ	negativ
Cyclospora cayetanensis (PCR)	negativ	negativ
Cryptosporidium spp. (PCR)	negativ	negativ
Dientamoeba fragilis (PCR)	negativ	negativ
Entamoeba histolytica (PCR)	negativ	negativ
Giardia lamblia (PCR)	negativ	negativ

Overzicht van de moleculaire ontlastingsdiagnostiek, verwijzing naar:

- Met microbiom geassocieerde gezondheidsrisico's

Overzicht ontlastingsdiagnostiek

- Indicatie van **Leaky gut** door verstoorde functie van de tight junctions (zonuline)
- Aanwijzing voor een beperkte bescherming tegen intestinale infecties



- Aanwijzing voor een afweerreactie van het intestinale mucosale immuunsysteem

Uitslaginterpretatie van het intestinale microbioom

Diversiteit

De microbiële diversiteit in uw ontlasting is **optimaal**.

In tegenstelling tot menselijke genomen, die 99,99% identiek zijn, vertoont het intestinaal microbioom een **hoge genetische diversiteit**. Met diversiteit wordt de soortenrijkdom bedoeld, die in een microbioom voorkomen. Fysiologisch bezit het microbioom een hoge diversiteit, dus een groot aantal van verschillende species. Bij een lage diversiteit is de mens zeer gevoelig voor verschillende ziektes, zoals het prikkelbaredarmsyndroom, voedingsintoleranties, chronisch inflammatoire darmziekten en infecties. De belangrijkste en meest voorkomende oorzaak voor een verminderde verscheidenheid is het gebruik van antibiotica, waarvan het spectrum een directe invloed op de vermindering van de diversiteit heeft.

FODMAP-Index

De samenstelling van uw darmmicrobiom wijst op een FODMAP-type 2.

Bij type 2 kan een FODMAP-arm dieet worden toegepast als een mogelijke behandeling om prikkelbare darm-achtige klachten en andere gastro-intestinale klachten te verminderen.

De term FODMAP ("Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols") beschrijft bepaalde, korte keten, gemakkelijk fermenteerbare koolhydraten alsook suikeralcoholen, die van nature in talrijke voedingsmiddelen aanwezig zijn. Patiënten met prikkelbare darm-achtige, gastro-intestinale klachten kunnen, afhankelijk van de samenstelling van hun intestinale microbiom, van een FODMAP-arme voeding profiteren.

Literatuurbronnen:

Staudacher H. The impact of low fodmap dietary advice and probiotics on symptoms in irritable bowel syndrome: a randomised, placebo-controlled, 2 × 2 factorial trial. Gut 2015; 64:A51.

Halmos E. P. A diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2014; 146(1):67-75.

Dysbiose

De ontlastingsuitslag vertoont een **aanzienlijk toegenomen rottingsflora**, die van nature in de menselijke darm aantoonbaar is, maar die alleen tot een bepaald kiemgetal getolereerd zou moeten worden. Rottingsbacteriën metaboliseren versterkt eiwit en vet, wat leidt tot de vorming van gassen en toxisch werkende metabolieten. Dat kan op lange termijn leiden tot schade aan het darmslijmvlies. De in de darm ontstane alkaliserende stofwisselingsproducten worden voor het grootste deel door de lever ontgift, waardoor het orgaan toch door de endogene

intoxicatie aanzienlijk belast wordt. Door deze endogene intoxicatie kan het komen tot een zo genaamde niet-alcoholische leververvetting (NASH resp. NAFLD) of tot een risico op maligne.

De ontlastingsflora wordt grotendeels door **sterk verhoogde kiemgetallen van histamine-vormende bacteriën** gekenmerkt, die maar tot een bepaald kiemgetal getolereerd zou moeten worden. Ze kunnen dus tot een aanzienlijke belasting van het organisme bijdragen. Histamine wordt door de dysbiotische darmflora via de decarboxylering van met de voeding opgenomen histidine gevormd. De oorzaken voor het woekeren van histaminevormers zijn divers, maar in principe door een verhoogd aanbod aan vet en eiwit of een onvoldoende antagoniserende werking van de fysiologische darmbacteriën.

Een modulatie van de microbiota in de darm door pro- of prebiotica kan in dit geval gunstig uitwerken op de intestinale homeostase en zou een therapeutische optie kunnen zijn.

Enterotype-bepaling

Het enterotype van uw ontlastingsmonster komt overeen met type 3.

Het intestinale microbiom kan in drie zogenaamde **enterotypes** ingedeeld worden. Deze zijn onafhankelijk van leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht en nationaliteit. Studies wijzen erop, dat jarenlange voedingsmonsters, bijvoorbeeld de consumptie van dierlijke vetten en proteïnen een verandering tussen enterotypes kunnen veroorzaken. Ook worden eerste verbanden tussen enterotype III en de ziekte atherosclerose beschreven (Karlsson FH et al, Symptomatic atherosclerosis is associated with an altered gut metagenome, Nat. Commun. 3:1245 (2012)).

Bio-indicatoren

Firmicutes/Bacteroidetes-verhouding

De stammen van de **firmicutes** en de **bacteroidetes** zijn met **meer dan 90%** de beide dominerende bacteriegroepen in de menselijke darm.

Daarbij kunnen darmbacteriën van de **firmicuten**-stammen door **afbraak van onverteerde voedselbestanddelen** aan het menselijk lichaam korte keten koolhydraten en vetzuren als **aanvullende energiebron** ter beschikking stellen.

In talrijke studies kon aangetoond worden, dat de verhouding van firmicutes tot bacteroidetes met het lichaamsgewicht van de mens samenhangt. Door een verhoogd aandeel van firmicutes wordt een verhoogde koolhydraathoeveelheid via het menselijke darmslijmvlies geresorbeerd.

Mucosaprotectieve flora

De mucosaprotectieve flora van uw monster ligt in het **optimale bereik**. Er is een adequate bescherming van de intestinale mucosa door *Akkermansia muciniphila* en *Faecalibacterium prausnitzii*.

Akkermansia muciniphila is een gramnegatief obligaat anaeroob staafje. Het is een mucine splitsende kiem, die onder andere door metabole splitsproducten wezenlijk aan de het behoud van de *Faecalibacterium prausnitzii* bijdraagt. Actuele studies toonden een positieve invloed van de bacterie op gezondheidsfactoren aan. Bovendien kon in studies een **anti-inflammatoire werking** en een positieve invloed van *Akkermansia muciniphila* op het behoud van een **intacte darmbarrière** aangetoond worden.

Faecalibacterium prausnitzii is een gramnegatief obligaat anaeroob staafje, dat tot de stam van de firmicutes behoort. De bacterie behoort tot de drie meest voorkomende anaërobe bacteriën van de darmflora. Bij patiënten met **inflammatoire darmziekten, prikkelbaredarmsyndroom** en **coeliakie** werden veranderingen bij specifieke bacteriënsoorten van de darmflora aangetoond. Een dergelijke verandering is de afname van het kiemgetal *Faecalibacterium prausnitzii*. In diverse studies konden belangrijke effecten van de bacterie op cellen van het immuunsysteem aangetoond worden. Bovendien is bekend, dat door de productie



Der **Enterotyp III** wordt door de overheersende bacteriegroep *Ruminococcus spp.* gekenmerkt. Deze is betrokken bij de hydrolyse van mucines en de opname van het daardoor ontstaande suiker door het celmembraan, alsook bij de biosynthese van heem.



Door veel recente studies kon een positieve correlatie van hoge kiemgetallen van de *Akkermansia muciniphila* en volgende toestanden aangetoond worden:

- ▶ Laag lichaamsgewicht
- ▶ Laag vetpercentage
- ▶ Gereduceerde metabole endotoxemie door bacteriële lipopolysacchariden
- ▶ Verminderde adipose weefselontsteking
- ▶ Verminderde insulineresistentie (diabetes type 2)

laboratorium rapport

Uitslag, Pagina 9 van 13



van boterzuur ontstekingsprocessen in de darm aanzienlijk gereduceerd worden. *Faecalibacterium prausnitzii* behoort aantoonbaar tot de grootste boterzuurvormende bacteriën in de dikke darm.

Alles bij elkaar reduceert *Faecalibacterium prausnitzii* intestinale ontstekingsprocessen en heeft een gunstige invloed op inflammatoire darmziektes, zoals de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa.

Butyraatvormende bacteriën

Butyraatvormende bacteriën zijn vooral *Faecalibacterium prausnitzii*, *Eubacterium spp.*, *Roseburia spp.*, *Ruminococcus spp.* en *Butyrivibrio crossotus*.

Dergelijke bacteriën verminderen darmonstekingsprocessen door de vorming van regulerende T-cellen te bevorderen en door de vorming van pro-inflammatoire cytokinen van macrofagen en dendritische cellen te remmen. Butyraat verhoogt bovendien het zuurstofverbruik van de colonocyten en verbetert het fenomeen van "fysiologische hypoxie" van het mucosa, dat bijdraagt aan de ondersteuning van de darmbarrièrefunctie. Bij kankercellen remt het de proliferatie en induceert het apoptose.

Een vermindering van de butyraatvormers kan ontstekingsprocessen bevorderen die de permeabiliteit van het darmslijmvlies (lekkende darm) verhogen en de verschijning van ontstekingsziekten (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa), prikkelbaredarmsyndroom, voedselintoleranties en coeliakie bevorderen.

Mucinedegraderende bacteriën

Mucinedegraderende bacteriën zijn vooral *Akkermansia muciniphila* en *Prevotella*-species. Dergelijke bacteriën kunnen mucine afbreken en zijn essentieel voor de vernieuwing van de fysiologische mucinelaag. Daardoor ondersteunen ze het behoud van een intacte darmbarrière door butyraatvormende bacteriën, zoals *Faecalibacterium prausnitzii*.

Sulfaatreducerende bacteriën

Sulfaatreducerende bacteriën zoals *Desulfovibrio spp.*, *Desulfomonas spp.* en *Desulfobacter spp.*, zijn anaërobe bacteriën die energie krijgen door sulfaatreductie en grote hoeveelheden sulfaat vormen. Het metabole eindproduct van de bacteriën is zwavelwaterstof, dat cytotoxische eigenschappen bezit. Zwavelwaterstof kan een remming van de butyraatoxidatie teweeg brengen, die essentieel is voor de energievoorziening van de colonocyten. Een toename van de sulfaatreducerende bacteriën kan een chronische ontsteking van het darmepitheel veroorzaken.

Methaan-producerende bacteriën

Methaan-producerende bacteriën zoals *Methanobrevibacter spp.* en *Methanobacterium spp.* behoren tot het domein van de Archaea. Ze worden gekenmerkt door het feit dat ze bacteriële primaire en secundaire fermentatieproducten, zoals waterstof en kooldioxide in methaan kunnen omzetten. Daardoor spelen ze een grote rol bij het optimaliseren van de energiebalans. Bovendien heeft methaan een remmend effect op de intestinale motiliteit, wat kan leiden tot een versterking van chronische obstipatie. Deze bacteriën kunnen ook dendritische cellen van het darmmucosa activeren en de vorming TNF-alpha en



In verschillende studies konden de volgende **immunologische effecten** van *F. prausnitzii* aangetoond worden:

- Remming van de transcriptiefactor NF- κ B → Remming van het pro-inflammatoire interleukins 8 (IL-8)
- Productie van boterzuur, die bovendien de factor NF-KB remt.
- Differentiatie van de regulatoire T-cellen daardoor toename van het anti-inflammatoire interleukins 10 (IL-10), afname van het pro-inflammatoire interleukins 12 (IL-12)

andere pro-inflammatoire cytokinen induceren.

Saccharolytische bacteriën

Saccharolytische bacteriën in de darm zijn verantwoordelijk voor de splitsing van complexe poly- en oligosacchariden zoals bijv. resistent zetmeel. Het melkzuur dat bij de splitsing ontstaat, dient andere bacteriën zoals *Ruminococcus bromii* of *Faecalibacterium prausnitzii* als basis voor de productie van boterzuur. Een sleutelrol speelt hierbij *Bifidobacterium adolescentis*, wat in een studie met gezonde proefpersonen onderzocht is (Venkataraman et al. Microbiome 2016).

LPS-bacteriën

LPS-bacteriën zijn gramnegatieve bacteriën, die in het buitenmembraan lipopolysacchariden (LPS) als zogenaamd endotoxine leiden en na het binnendringen in de darmmucosa bij een Leaky-Gut pro-inflammatoire processen kunnen activeren. De activering van het immuunsysteem kan als consequentie een laaggradige chronische ontsteking ("silent Inflammation") hebben.

Neuroactieve microbiota

Neuroactieve microbiota zijn microbiota, die meewerken aan het metabolisme van neuroactieve stoffen of dergelijke stoffen vormen.

Alistipes-soorten zijn indol-positief en kunnen daarmee de beschikbaarheid van tryptofaan beïnvloeden.

Omdat **tryptofaan de voorloper is van serotonine**, kan het verhoogde kiemgetal van *Alistipes* daarom het evenwicht van het serotonerge systeem in de darm verstoren. *Oscillibacter* vormt valeriaanzuur als de belangrijkste metabooliet. Valeriaanzuur heeft een structurele gelijkenis met **gamma-aminoboterzuur (GABA)** en kan, net als GABA, binden aan GABA-receptor en deze remmen. Bacteriën die het neuroactieve **gamma-aminoboterzuur (GABA)** kunnen vormen, omvatten o.a. *Bifidobacterium adolescentis*, *Bifidobacterium dentium*, *Lactobacillus brevis*, *Lactobacillus plantarum* en *Lactobacillus paracasei*.

Microbioom-geassocieerde gezondheidsrisico's

De gespecificeerde risico's vormen geen diagnose, maar eerder die in de huidige wetenschappelijke studies bepaalde statistische relaties tussen ziektekiemen en specifieke ziektebeelden in relatie tot de vastgestelde microbiom..

Metabole ziekten	Prikkelbare-darmsyndroom	Inflammatoire darmziekten	Autoimmuunziektes	Neurologische ziektes
Adipositas	Prikkelbare darm	Chronisch-inflammatoire darmaandoeningen	Coeliakie	Depressie
Diabetes mellitus type 2	Leaky gut syndroom	Gastrointestinale gevoeligheid voor infecties	Reumatoïde artritis	Chronisch vermoeidheidssyndroom
Cardiovasculaire ziektes	Histamine-intolerantie	Dysbiose	Psoriasis	Autisme Spectrum Stoornis
Niet-alcoholische leververvetting	Voedselintolerantie	Kolonisatieresistentie	Allergie / astma	De ziekte van Parkinson
Alcoholische leververvetting	SIBOS		Diabetes mellitus type 1	De ziekte van Alzheimer

Prikkelbare darmsyndroom

Histamine-intolerantie

Histamine speelt een centrale rol bij allergische reacties en fungeert als een bemiddelaar bij ontstekingsprocessen. Verhoogde fecale histamineconcentraties kunnen veroorzaakt zijn door een toegenomen histamine-inname via de voeding of verhoogde intestinale rottingsactiviteit en histamine-synthese van darmbacteriën. Deze bacteriële metabole activiteit wordt voornamelijk veroorzaakt door het hoge aantal Proteobacteria. Bij een gelijktijdig gereduceerde diversiteit kunnen symptomen zoals bij histaminine-intolerantie voorkomen. Een toereikend aantal van




Risicoparameters histamine-intolerantie	
Citrobacter spp.	
Clostridium spp.	
Enterobacter spp.	
Serratia spp.	
Escherichia spp.	



boterzuurproducerende bacteriën zoals *Faecalibacterium prausnitzii* alsook een grote verscheidenheid van de bacteriën in de darm kunnen oorzakelijk deze symptomen tegengaan.

Maag-darm-diagnostiek - interpretatie van de uitslag



Malabsorptie / ontsteking

Calprotectine in de ontlasting

De **calprotectinewaarde** vertoont **geen bijzonderheden**.

Calprotectine is een eiwit waarvan neutrofiële granulocyten bij **inflammatoire darmziekten** meer produceren. Verhoogde calprotectinewaarden komen vooral voor bij chronisch-inflammatoire darmziekten. De hoogte van de calprotectinewaarde correleert met de ontstekingsactiviteit en vormt dan ook een uitstekende parameter voor het verloop bij chronisch-inflammatoire darmziekten zoals M. Crohn of colitis ulcerosa. Calprotectinewaarden boven ca. 400 mg/l duiden bij een bekende IBD op een acute exacerbatie. Verhoogde calprotectinewaarden met een onduidelijke oorzaak dienen in ieder geval te worden opgehelderd.

Zonuline in de ontlasting

Een **verhoogde zonulineconcentratie** duidt op een verstoorde functie van de tight junctions, wat kan resulteren in een verhoogde mucosale permeabiliteit in de zin van een "leaky gut". Dit kan leiden tot ontstekingsreacties in het darmslijmvlies. Bovendien kan een verhoogde instroom van antigenen uit het darmlumen in de bloedsomloop leiden tot systemische ontsteking met omvangrijke gevolgen.

Recente klinische studies hebben aangetoond dat verhoogde darmpermeabiliteit kan optreden bij patiënten met chronische inflammatoire darmaandoeningen, coeliakie, diabetes mellitus en andere auto-immuunziekten, evenals na door antibiotica geïnduceerde dysbiose.

Zonuline is een menselijk eiwit dat in de enterocyten van het darmslijmvlies

gevormd wordt. Het dient voor het reguleren van de intercellulaire "occludens-verbindingen" (tight junctions) die zich tussen de individuele darmepitheelcellen bevinden. Het is hun taak om de celstructuur af te dichten. Door te binden aan een specifieke receptor op het oppervlak van de enterocyt, induceert zonuline een waterval aan biochemische processen, die een regulering resp. een opening van de tight junctions veroorzaakt. Daarom ontstaat uit een overmatige afgifte van zonuline het risico op een "leaky gut". Microbiële endotoxinen en gliadine worden beschouwd als de oorzaak van verhoogde zonulinesynthese.

voedselallergie

Eosinophil proteïne X i. ontlasting

EPX is een glycoproteïne die vrijkomt door geactiveerde eosinofielen. Het cytotoxische eiwit speelt een belangrijke rol in de afweer tegen ziekteverwekkers van parasieten en bacteriën. Als het eiwit vrijkomt tijdens eosinofielenactivering, kan dit leiden tot weefselvernietiging en ontsteking.

Oorzaak van een **verhoogde EPX-waarde** (eosinofiel proteïne X) kan een voedselintolerantie, parasitose of een niet-specifieke ontstekingsziekte van het darmslijmvlies zijn.

Maldigestie/Pancreaselastase in de ontlasting

De **Pancreaselastase ligt hier in het lage normbereik**. Misschien kan het in het kader van een zogenaamde intermitterende pancreasinsufficiëntie stapsgewijs komen tot een sterkere daling van de enzymvorming, waardoor er fasengewijs buikklachten kunnen ontstaan. Ook bij moeilijk te verteren of grote maaltijden kunnen latente Maldigestieklachten ontstaan.

Er moet grondig rekening gehouden worden met dieetmaatregelen - vooral in geval van buikklachten -. Een controle van de pancreaselastase is aanbevelenswaardig. Afhankelijk van het klinische beeld kunnen ook fytotherapeutische maatregelen kunnen nuttig zijn (bv. tinct. Harongae of Harongan®).

slijmvliesimmunitet

beta-Defensine 2

De **verlaagde β -defensine-spiegels** moeten worden gezien als uiting van een defecte mucosale immuunafweer.

β -defensinen zijn lichaamseigen, antimicrobieel werkende peptiden die bij het aangeboren, niet specifieke immuunsysteem horen. Zij hebben tot doel bacteriën, schimmels, virussen en protozoën af te weren. Defensinen komen in alle epithelen van het lichaam voor, waarbij vooral de intestinale tractus vanwege de exorbitante confrontatie met microben in bijzondere mate afhankelijk is van adequate defensinespiegels.

Na stimulatie door microbiële antigenprikkels worden ze in het darmlumen afgegeven. Vooral in de Paneth-cellen van de dunne darm komt een uitgesproken defensine-expressie voor.

Verlaagde defensinespiegels gaan gepaard met een verhoogd infectierisico, waarbij in dit geval ook commensale bacteriën uit de darmflora ontstekingsreacties kunnen veroorzaken. Uiteindelijk zou een dergelijk fenomeen echter als adequate immuunreactie van het mucosale systeem moeten worden geïnterpreteerd, die uitsluitend door een ontoereikende bescherming door defensine is getriggerd.

De vorming β -defensine kan bijvoorbeeld door toediening van colibacteriën geïnduceerd worden.

Secretair IgA in de ontlasting

Verhoogde sIgA-concentraties duiden op toegenomen activiteit van het mucosale immuunsysteem. De oorzaak voor de afweerreactie kan een inflammatoir of allergisch proces in het darmslijmvlies zijn.

Aangezien sIgA in tegenstelling tot andere immuunglobulinen geen immunologische vervolgreacties uitlokt, kan het afweerproces -ook bij aanzienlijke verhoogde sIgA-waarden - onopgemerkt voor de patiënt verlopen.

sIgA vormt als het ware een "beschermende coating" (antibody-painting) voor het oppervlak van het darmslijmvlies.



Het **secretaire immuunglobuline A** verschaft een eerste overzicht over de functie van het immuunsysteem van de darm (GALT); belemmert het binnendringen en de kolonisatie van potentieel pathogene bacteriën, virussen of schimmels via het darmslijmvlies en neutraliseert tal van antigenen (ook antigenen in voedingsmiddelen) en toxinen.



Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te nemen met een arts of therapeut. Voor inhoudelijke vragen over de testen en/of uitslagen, dus niet voor behandeladviezen of een uitvoerig consult, kunt u contact opnemen met ons gratis telefonische spreekuur. Kijk op medivere.nl bij telefonisch spreekuur voor de tijden en telefoonnummers.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.
Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening geldig.

De met * gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze laboriapartners .